

**ONGLYZA®**  
**saxagliptina**

**AstraZeneca do Brasil Ltda.**

**Comprimidos revestidos**

**2,5 mg e 5 mg**

**ONGLYZA®**  
**saxagliptina**

**I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

**ONGLYZA®**  
saxagliptina

**APRESENTAÇÕES**

ONGLYZA (saxagliptina) é apresentado na forma de:

Comprimidos revestidos com 2,5 mg de saxagliptina em embalagem com 28 comprimidos.

Comprimidos revestidos com 5 mg de saxagliptina em embalagens com 28 comprimidos.

**USO ORAL**

**USO ADULTO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido revestido de OONGLYZA 2,5 mg contém 2,79 mg de cloridrato de saxagliptina (anidra) equivalente a 2,5 mg de saxagliptina.

Cada comprimido revestido de OONGLYZA 5 mg contém 5,58 mg de cloridrato de saxagliptina (anidra) equivalente a 5 mg de saxagliptina.

Excipientes: lactose monoidratada, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, álcool polivinílico, polietilenoglicol, dióxido de titânio, talco e óxidos de ferro. Azul de indigotina e goma laca estão presentes na marcação dos comprimidos.

## II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

ONGLYZA pode ser utilizado em monoterapia (sozinho) ou como terapia combinada, ou seja, associado a outro medicamento para o tratamento da diabetes.

**Monoterapia:** OONGLYZA é indicado para melhorar o controle glicêmico (nível de açúcar no sangue) de pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2, em associação com dieta e exercício.

#### **Terapia combinada:**

**Combinação em adição:** OONGLYZA é indicado em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 para melhorar o controle glicêmico em combinação com metformina, uma tiazolidinediona, uma sulfonilureia, metformina com um inibidor de SGLT2, metformina com uma sulfonilureia ou insulina (com ou sem metformina) quando a terapia utilizada, juntamente com dieta e exercício, não proporcionarem controle glicêmico adequado.

**Combinação inicial:** OONGLYZA é indicado para uso em terapia combinada inicial com metformina, como um adjuvante à dieta e exercício, para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, quando a terapia dupla de saxagliptina e metformina for apropriada.

#### **Importantes limitações de uso**

ONGLYZA não deve ser utilizado para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 ou para o tratamento da cetoacidose diabética (complicação mais grave, em que há aumento no nível de cetonas circulantes no sangue ou urina e diminuição do pH do sangue) pois pode não ser eficaz nesses casos.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

ONGLYZA é um medicamento que atua sobre uma enzima de controle da liberação de glicose para o sangue: a dipeptidil peptidase 4 (DPP-4). OONGLYZA melhora o controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2 em associação com dieta e exercício físico.

## ONGLYZA:

- Reduz a concentração de açúcar no sangue, especialmente após as refeições. OONGLYZA também reduz a concentração de açúcar no sangue entre as refeições;
- Promove o aumento de secreção de insulina pelo organismo após as refeições;
- Modera a produção de açúcar pelo fígado após as refeições. É improvável que OONGLYZA isoladamente diminua a concentração de açúcar a um nível perigoso, ao ponto de causar hipoglicemia, uma vez que não tem ação quando o nível de açúcar no sangue está baixo.

## 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ONGLYZA é contraindicado em pacientes com histórico de hipersensibilidade grave (reação alérgica), como anafilaxia ou angioedema, a qualquer inibidor da enzima DPP-4 (ONGLYZA e outros medicamentos da mesma classe).

Os sintomas de reação alérgica grave podem incluir: erupções cutâneas (irritação na pele), aumento de manchas vermelhas na pele (urticária), inchaço na face, lábios, língua e garganta, podendo causar dificuldade em respirar ou engolir.

ONGLYZA é contraindicado para pacientes com reações alérgicas a qualquer um dos seus componentes.

## 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

### **Uso com medicamentos que podem causar hipoglicemia** (nível baixo de açúcar no sangue)

Quando OONGLYZA foi administrado em combinação com uma sulfonilureia ou com insulina, houve maior incidência de hipoglicemia confirmada. Portanto, pode ser necessária a administração de uma dose menor de sulfonilureia ou insulina para diminuir o risco de hipoglicemia quando utilizados em combinação com OONGLYZA.

Em períodos de estresse corporal, como febre, trauma, infecção ou cirurgia, entre em contato com seu médico para que o mesmo o oriente sobre a conduta medicamentosa adequada.

## **Reações de hipersensibilidade**

As seguintes reações adversas foram relatadas com o uso de saxagliptina: reações de hipersensibilidade grave, incluindo anafilaxia e angioedema. Se houver suspeita de reação de hipersensibilidade grave à saxagliptina, você deve interromper o tratamento e procurar seu médico.

## **Pancreatite**

Houve relatos espontâneos de pancreatite aguda como reação adversa. Os pacientes devem ser informados sobre o sintoma característico de pancreatite aguda: dor abdominal intensa e persistente. Se houver suspeita de pancreatite, você deve interromper o tratamento com ONGLYZA e procurar seu médico imediatamente.

## **Uso em pacientes com deficiência nos rins**

Para pacientes com deficiência moderada ou grave nos rins ou com deficiência nos rins em estágio terminal e que realizam hemodiálise é necessário adequar a dose única diária deste medicamento, para isso é recomendado que seja realizado um exame para avaliar a função dos rins antes e durante o tratamento com ONGLYZA.

## **Gravidez e Amamentação**

Informe ao seu médico se você está grávida ou se pretende engravidar.

Não se sabe se a saxagliptina é secretada no leite humano. Se você estiver amamentando, informe ao seu médico.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

**Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **Uso pediátrico**

A segurança e a eficácia de ONGLYZA em pacientes pediátricos não foram estabelecidas.

## **Uso em idosos**

Pacientes idosos normalmente apresentam diminuição na função dos rins, portanto deve-se ter cuidado na seleção da dose para pacientes idosos, com base no funcionamento dos rins.

## **Insuficiência Cardíaca**

ONGLYZA deve ser utilizado com cautela em pacientes com fatores de risco conhecidos para hospitalização por insuficiência cardíaca, tais como históricos de insuficiência cardíaca (coração dilatado) ou insuficiência renal moderada a grave. Portanto, informe seu médico se você já teve problemas cardíacos ou se você apresenta algum problema nos seus rins.

Contate o seu médico imediatamente caso apresente algum dos sintomas a seguir:

- Respiração curta e acelerada ou dificuldade para respirar, especialmente quando se deitar;
- Aumento de peso corporal rápido e fora do comum;
- Inchaço nos pés, tornozelos e pernas.

Estes podem ser sintomas de insuficiência cardíaca.

## **Artralgia**

Dor nas articulações, que pode ser grave, foi relatada na experiência pós-comercialização para inibidores da enzima DPP4 (ONGLYZA e outros medicamentos da mesma classe). Os pacientes tiveram alívio dos sintomas após descontinuação da medicação e alguns tiveram recorrência dos sintomas com a reintrodução da terapia com o mesmo ou outro inibidor da enzima DPP-4. O início dos sintomas, após o início da terapia, pode ser rápido ou ocorrer após longo período de tratamento. Se você apresentar dor de forte intensidade nas articulações, a terapia deverá ser avaliada pelo seu médico.

## **Penfigoide bolhoso**

Casos de penfigoide bolhoso (doença autoimune que provoca bolhas na pele) foram relatados na experiência pós-comercialização com o uso de medicamentos da classe do ONGLYZA. Se você

desenvolver bolhas ou feridas após o uso de ONGLYZA informe o seu médico imediatamente (ver item 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?).

### **Efeitos na capacidade de dirigir e operar máquinas**

Não foi realizado nenhum estudo para verificar a capacidade de dirigir e de operar máquinas. Entretanto, considerar o risco de tontura com o uso de ONGLYZA.

### **Interações medicamentosas**

Pode haver interação de ONGLYZA com outros medicamentos e também, outros medicamentos podem afetar a ação de ONGLYZA. Contate o médico se você irá iniciar ou interromper o uso de medicamentos, como antibióticos, antifúngicos ou medicamentos para o HIV/AIDS, pois pode ser necessário um ajuste da dose de ONGLYZA.

### **Efeitos de outros medicamentos na ação da saxagliptina**

A ação da saxagliptina não foi significativamente alterada por metformina, glibenclamida, pioglitazona, digoxina, simvastatina, diltiazem, cetoconazol, rifampicina, omeprazol, hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + simeticona em combinação ou famotidina.

### **Efeitos da saxagliptina na ação de outros medicamentos**

A saxagliptina não altera significativamente a ação da metformina, glibenclamida, pioglitazona, digoxina, simvastatina, diltiazem, cetoconazol ou contraceptivos orais combinados de estrógeno/progestina.

### **ONGLYZA pode ser administrado com ou sem alimentos.**

### **Achados Laboratoriais**

**Vide 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? - Achados Laboratoriais.**



**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.**

**ONGLYZA 2,5 mg**

**Atenção: Contém lactose monoidratada. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

**Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo e azul de indigotina, que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.**

**ONGLYZA 5 mg**

**Atenção: Contém lactose monoidratada. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

**Atenção: Contém os corantes dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho e azul de indigotina, que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar o produto em temperatura ambiente (15° - 30°C).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

ONGLYZA 2,5 mg: comprimido amarelo a amarelo claro, biconvexo e arredondado.

ONGLYZA 5 mg: comprimido rosa, biconvexo e arredondado.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Os comprimidos de ONGLYZA não devem ser partidos ou cortados. ONGLYZA deve ser administrado por via oral com ou sem alimentos.

**Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.**

### **Posologia**

#### **- Monoterapia e terapia combinada**

A dose recomendada de ONGLYZA é de 2,5 mg ou 5 mg uma vez ao dia como monoterapia ou em terapia combinada com outros medicamentos.

#### **- Insuficiência renal**

Recomenda-se que a função renal seja avaliada antes do início do tratamento com ONGLYZA e posteriormente de maneira periódica.

##### *Insuficiência renal leve*

Não é necessário ajuste de dose para pacientes com insuficiência renal leve [taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) 60-89 mL/min/1,73 m<sup>2</sup> (pela fórmula MDRD, da sigla em inglês *Modification of Diet in Renal Disease* ou Modificação da Dieta na Doença Renal)].

##### *Insuficiência renal moderada*

Não é necessário ajuste de dose para pacientes com TFGe  $\geq$  45 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>.

Para pacientes com insuficiência renal moderada, com TFGe  $<$  45 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>, a dose é de 2,5 mg uma vez ao dia.

### *Insuficiência renal grave*

Para pacientes com insuficiência renal grave ( $\text{TFGe} < 30 \text{ mL/min/1,73 m}^2$ ), ou com doença renal em estágio terminal que requeiram hemodiálise, a dose é de 2,5 mg uma vez ao dia. ONGYZA deve ser administrado após hemodiálise.

ONGYZA não foi estudado em pacientes submetidos à diálise peritoneal.

### **- Medicamentos considerados fortes inibidores de uma enzima (CYP3A4/5)**

A dose recomendada de ONGYZA é de 2,5 mg em dose única diária quando coadministrada com fortes inibidores do citocromo P450 3A4/5 (CYP3A4/5) (por exemplo, cetoconazol, atazanavir, claritromicina, indinavir, itraconazol, nefazodona, nefinavir, ritonavir, saquinavir e telitromicina).

### **- Insuficiência hepática**

Não é necessário ajuste de dose de ONGYZA para pacientes com insuficiência hepática leve, moderada ou grave.

### **- Pacientes pediátricos**

Não foram conduzidos estudos de eficácia e segurança com ONGYZA em pacientes pediátricos.

### **- Pacientes idosos**

Não é necessário ajuste da dose de ONGYZA com base na idade. Pacientes idosos, normalmente, apresentam diminuição na função dos rins, portanto deve-se ter cuidado na seleção da dose em pacientes idosos, com base na função dos rins.

Para segurança e eficácia desta apresentação, ONGYZA não deve ser administrado por vias não recomendadas. A administração deve ser somente pela via oral.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você se esqueça de tomar ONGLYZA no horário planejado, tome assim que lembrar. Se já estiver próximo do horário da próxima dose, tome apenas a dose seguinte, no horário habitual. Nunca devem ser administradas duas doses ao mesmo tempo, a não ser sob orientação do seu médico.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.**

## 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

As seguintes reações adversas foram relatadas em pacientes que receberam ONGLYZA em estudos clínicos:

Reações Comuns (ocorreram entre 1% e 10% dos pacientes): infecção do trato respiratório superior (como gripes e resfriados), infecção do trato urinário (popularmente chamada “cistite”), dor de cabeça, sinusite, dor abdominal, gastroenterite (infecção do sistema gastrointestinal), vômito, edema periférico (inchaço dos tornozelos, pés ou pernas), nasofaringite (infecção da nasofaringe, parte nasal da faringe, que é uma região posterior à cavidade nasal), hipoglicemia (baixo nível de glicose no sangue), eventos relacionados a alergias (tais como, urticária e inchaço da face), linfopenia (diminuição dos linfócitos no sangue).

A hipoglicemia (baixos níveis de açúcar no sangue) pode agravar-se em pessoas que estejam fazendo outro tratamento para diabetes, tais como uso de sulfonilureias. Hipoglicemia também pode ocorrer em caso de uso de ONGLYZA com dapagliflozina e metformina. Informe seu médico se estiver tomando outros medicamentos para diabetes. Se você tiver sintomas de hipoglicemia, procure seu médico. Os sintomas de hipoglicemia incluem: agitação, sudorese, batimento cardíaco rápido, mudança na visão, fome, dor de cabeça e mudança no humor.

Inchaço ou retenção de líquidos nas mãos, pés ou tornozelos (edema periférico) pode agravar em pessoas que também estiverem fazendo uso de tiazolidinediona para tratar a diabetes. Se você não souber se faz uso deste tipo de medicação, pergunte ao seu médico.

## **Reações de hipersensibilidade**

Eventos relacionados à hipersensibilidade (alergia), tais como urticária e edema facial foram relatados nos estudos. Nenhum desses eventos em pacientes que receberam ONGLYZA necessitou de internação ou foram relatados como risco de vida por parte dos investigadores. Um paciente tratado no estudo com saxagliptina interrompeu o tratamento devido à urticária generalizada e edema facial.

## **Infecções**

Na base de dados de estudos de saxagliptina, houve até o momento 6 relatos de tuberculose. A causalidade não foi estabelecida e até o momento existem muito poucos casos para se determinar se a tuberculose está relacionada ao uso de saxagliptina.

## **Achados Laboratoriais**

Nos estudos clínicos, foi verificada uma diminuição na contagem de linfócitos (células de defesa do sangue), que não foi associada com outros problemas importantes.

## **Experiência pós-comercialização**

Durante a experiência pós-comercialização, as seguintes reações adversas foram relatadas com o uso de saxagliptina: pancreatite aguda, artralgia (dor nas articulações), penfigoide bolhoso (doença autoimune que provoca bolhas na pele) e reações de hipersensibilidade graves, incluindo anafilaxia, angioedema, erupções cutâneas e urticária. Como estas reações são relatadas voluntariamente por uma população de tamanho incerto, não é possível estimar a sua frequência com confiança.

**Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**



## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Se você acredita que ingeriu uma quantidade muito grande de ONGLYZA entre em contato com seu médico ou com o Centro de Toxicologia mais próximo.

Caso ocorra um evento de superdosagem, tratamento de suporte apropriado deve ser iniciado conforme o estado clínico do paciente. A saxagliptina e seu metabólito ativo são removidos através de hemodiálise (23% da dose após quatro horas).

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **III) DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.1618.0261

Produzido por: AstraZeneca Pharmaceuticals LP - Mount Vernon - Indiana - Estados Unidos

Importado e Registrado por: **AstraZeneca do Brasil Ltda.**

Rod. Raposo Tavares, km 26,9 - Cotia – SP – CEP 06707-000

CNPJ 60.318.797/0001-00

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO**

**ONG028**

**Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 22/05/2025.**





## Histórico de Alteração de Bula

| Dados da submissão eletrônica |                      |  | Dados da petição/notificação que altera bula |                      |  |                   | Dados das alterações de bulas   |                  |  |
|-------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|-------------------|---|------------------|--|
| Data do expediente            | Número do expediente | Assunto  | Data do expediente                           | Número do expediente | Assunto  | Data de aprovação | Itens de bula   | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                 |
| 20/08/2017                    | 1771112176           | 10458-<br>MEDICAMENTO NOVO -<br>Inclusão Inicial<br>de Texto de<br>Bula – RDC<br>60/12             | 05/01/2017                                   | 0040506174           | MEDICAMENTO<br>NOVO –<br>Solicitação de<br>Transferência de<br>Titularidade de<br>Registro (operação<br>comercial) | 22/05/2017        | Alteração de Dizeres<br>Legais (transferência<br>da titularidade de<br>registro de Bristol<br>Myers-Squibb Ltda.<br>para AstraZeneca do<br>Brasil Ltda)   | VP e<br>VPS      | Comprimido<br>revestido<br>com 2,5mg e 5mg |
| 13/12/2017                    | 2285858170           | 10451 -<br>MEDICAMENTO NOVO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>RDC<br>60/12 | 17/11/2017                                   | 2216237172           | 11017 – RDC<br>73/2016 - NOVO -<br>Inclusão de local<br>de embalagem<br>primária do<br>medicamento                 | 17/11/2017        | Alteração de Dizeres<br>Legais (Inclusão de<br>AstraZeneca<br>Pharmaceuticals LP –<br>Newark, EUA como<br>embalador primário e<br>secundário do<br>medicamento)   | VP e VPS         | Comprimido<br>revestido<br>com 2,5mg e 5mg |
| 11/07/2019                    | 0608472199           | 10451 -<br>MEDICAMENTO NOVO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula –<br>RDC<br>60/12 | 11/07/2019                                   | 0608472199           | 10451 -<br>MEDICAMENTO<br>NOVO -<br>Notificação de<br>Alteração de Texto<br>de Bula – RDC<br>60/12                 | 11/07/2019        | Atualização de<br>Apresentações<br>conforme<br>apresentações<br>comercializadas;<br>Atualização do<br>logotipo do Serviço de<br>Atendimento ao<br>Consumidor (SAC);<br>Realocação das<br>referências<br>bibliográficas; | VP e VPS         | Comprimido<br>revestido<br>com 2,5mg e 5mg |

|            |            |  |            |            |  |            | Atualização da frase de segurança   |          |                                      |
|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|---|----------|--------------------------------------|
| 16/10/2019 | 2512841198 | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula | 20/12/2018 | 1201086183 | 11121 – RDC 73/2016 – NOVO – Inclusão de nova indicação terapêutica  | 06/05/2019 | Indicações<br>Resultados de Eficácia<br>Posologia e Modo de usar<br>Reações Adversas          | VP e VPS | Comprimido revestido com 2,5mg e 5mg |
|            |            |  | 16/10/2019 | 2512841198 | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula | 16/10/2019 | Advertências e Precauções<br>Reações Adversas   | VP e VPS | Comprimido revestido com 2,5mg e 5mg |
| 24/06/2020 | 2008910204 | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula | 03/08/2018 | 0776391183 | 11118 RDC 73/2016 - NOVO - Alteração de Posologia                    | 25/05/2020 | Indicações<br>Resultados de Eficácia<br>Advertências e Precauções<br>Posologia e modo de usar | VP e VPS | Comprimido revestido com 2,5mg e 5mg |
|            |            |  | 24/06/2020 | 2008910204 | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula | 24/06/2020 | Dizeres Legais  | VP e VPS | Comprimido revestido com 2,5mg e 5mg |
| 27/08/2020 | 2886770200 | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula | 27/08/2020 | 2886770200 | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula | 27/08/2020 | Advertências e Precauções   | VPS      | Comprimido revestido com 2,5mg e 5mg |
| 19/04/2021 | 1490579215 | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula | 19/04/2021 | 1490579215 | 10451 – MEDICAMENTO NOVO – Notificação de Alteração de Texto de Bula | 19/04/2021 | Reações adversas  | VPS      | Comprimido revestido com 2,5mg e 5mg |

|    |    |   |    |    |  |    |  |          |  |
|----|----|---|----|----|--|----|--|----------|--|
| -- | -- | 10451 –<br>MEDICAMENTO<br>NOVO –<br>Notificação de<br>Alteração de Texto<br>de Bula | -- | -- | 10451 –<br>MEDICAMENTO<br>NOVO – Notificação<br>de Alteração de Texto<br>de Bula | -- | Composição<br>Advertências e<br>Precauções<br>Dizeres Legais | VP e VPS | Comprimido<br>revestido<br>com 2,5mg e 5mg |
|----|----|---|----|----|--|----|--|----------|--|