

**Polvilho Antisséptico Granado  
Tradicional**

**Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.**

**Pó de uso tópico**

**100 g e 200 g**

## BULA DO PACIENTE

### **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:**

#### **POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO TRADICIONAL**

ácido salicílico + enxofre + ácido bórico + óxido de zinco

### **APRESENTAÇÃO:**

#### **PÓ DE USO TÓPICO**

#### **USO ADULTO**

#### **Composição**

Cada 100 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,352 g, enxofre 17,602 g, ácido bórico 3 g, óxido de zinco 11,735 g

Excipientes: amido e talco.

Cada 200 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,704 g, enxofre 35,204 g, ácido bórico 6 g, óxido de zinco 23,47 g

Excipientes: amido e talco.

### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

#### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado para combater assaduras, brotoejas e os odores da transpiração dos pés e axilas. Para prevenir pruridos e frieiras. Para combater as micoses entre os dedos dos pés. Clinicamente testado.

#### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Este medicamento possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas e odores da transpiração. O ácido bórico e o enxofre têm ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis.

#### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento deve ser usado apenas por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.**

**Não use este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação e levar à morte.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento deve ser usado apenas por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.**

**Não use este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação e levar à morte.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C).

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

**Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de esquecimento, o tratamento deve prosseguir normalmente.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

É geralmente bem tolerado e não apresenta contraindicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, suspenda o uso e procure orientação médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS:**

Registros:

100 g - 1.0817.0030.0025  
200 g - 1.0817.0030.0033

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.  
CNPJ: 33.109.356/0001-17  
Av. Barão de Tefé nº34, and. 14º e 15º, Rio de Janeiro - RJ

Produzido por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.  
CNPJ: 33.109.356/0004-60  
Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

Resp. Técnico: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447

Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor:

Tel.: 0800 940 6730 / [sac@granado.com.br](mailto:sac@granado.com.br) / [www.granado.com.br](http://www.granado.com.br)

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**

As expressões “**POLVILHO ANTISSÉPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S. A..

**Polvilho Antisséptico Granado  
Sport**

**Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.**

**Pó de uso tópico**

**100 g**

**BULA DO PACIENTE**

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:**

**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO SPORT**

ácido salicílico + enxofre + ácido bórico + óxido de zinco

**APRESENTAÇÃO:**

**PÓ DE USO TÓPICO**

**USO ADULTO**

**Composição**

Cada 100 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,352 g, enxofre 17,602 g, ácido bórico 3 g, óxido de zinco 11,735 g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado para combater assaduras, brotojas e os odores da transpiração dos pés e axilas. Para prevenir pruridos e frieiras. Para combater as micoses entre os dedos dos pés. Clinicamente testado.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Este medicamento possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotojas e odores da transpiração. O ácido bórico e o enxofre têm ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento deve ser usado apenas por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.**

**Não use este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação e levar à morte.**

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento deve ser usado apenas por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.**

**Não use este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação e levar à morte.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C).

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

**Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de esquecimento, o tratamento deve prosseguir normalmente.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

É geralmente bem tolerado e não apresenta contraindicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, suspenda o uso e procure orientação médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS:**

Registro: 1.0817.0030.0068

Registrado por:  
Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.  
CNPJ: 33.109.356/0001-17  
Av. Barão de Tefé nº34, and. 14º e 15º, Rio de Janeiro - RJ

Produzido por:  
Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.  
CNPJ: 33.109.356/0004-60  
Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

Resp. Técnico: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447  
Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor:  
Tel.: 0800 940 6730 / [sac@granado.com.br](mailto:sac@granado.com.br) / [www.granado.com.br](http://www.granado.com.br)

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**

As expressões “**POLVILHO ANTISSÉPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S. A..

**Polvilho Antisséptico Granado  
Fresh**

**Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.**

**Pó de uso tópico**

**100 g**

**BULA DO PACIENTE**

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:**

**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO FRESH**

ácido salicílico + enxofre + ácido bórico + óxido de zinco

**APRESENTAÇÃO:**

**PÓ DE USO TÓPICO**

**USO ADULTO**

**Composição**

Cada 100 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,352 g, enxofre 17,602 g, ácido bórico 3 g, óxido de zinco 11,735 g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado para combater assaduras, brotojas e os odores da transpiração dos pés e axilas. Para prevenir pruridos e frieiras. Para combater as micoses entre os dedos dos pés. Clinicamente testado.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Este medicamento possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotojas e odores da transpiração. O ácido bórico e o enxofre têm ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento deve ser usado apenas por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.**

**Não use este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação e levar à morte.**

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento deve ser usado apenas por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.**

**Não use este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação e levar à morte.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C).

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

**Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de esquecimento, o tratamento deve prosseguir normalmente.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

É geralmente bem tolerado e não apresenta contraindicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, suspenda o uso e procure orientação médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS:**

Registros: 1.0817.0030.0041

Registrado por:  
Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.  
CNPJ: 33.109.356/0001-17  
Av. Barão de Tefé nº34, and. 14º e 15º, Rio de Janeiro - RJ

Produzido por:  
Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.  
CNPJ: 33.109.356/0004-60  
Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

Resp. Técnico: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447  
Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor:  
Tel.: 0800 940 6730 / [sac@granado.com.br](mailto:sac@granado.com.br) / [www.granado.com.br](http://www.granado.com.br)

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**

As expressões “**POLVILHO ANTISSÉPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S. A..

**Polvilho Antisséptico Granado  
Pink**

**Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.**

**Pó de uso tópico**

**100 g**

**BULA DO PACIENTE**

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:**

**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO PINK**

ácido salicílico + enxofre + ácido bórico + óxido de zinco

**APRESENTAÇÃO:**

**PÓ DE USO TÓPICO**

**USO ADULTO**

**Composição**

Cada 100 g do medicamento contém:

ácido salicílico 0,352 g, enxofre 17,602 g, ácido bórico 3 g, óxido de zinco 11,735 g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado para combater assaduras, brotojas e os odores da transpiração dos pés e axilas. Para prevenir pruridos e frieiras. Para combater as micoses entre os dedos dos pés. Clinicamente testado.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Este medicamento possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotojas e odores da transpiração. O ácido bórico e o enxofre têm ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento deve ser usado apenas por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.**

**Não use este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação e levar à morte.**

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento deve ser usado apenas por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.**

**Não use este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação e levar à morte.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C).

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

**Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de esquecimento, o tratamento deve prosseguir normalmente.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

É geralmente bem tolerado e não apresenta contraindicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, suspenda o uso e procure orientação médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS:**

Registro: 1.0817.0030.0084

Registrado por:  
Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.  
CNPJ: 33.109.356/0001-17  
Av. Barão de Tefé nº34, and. 14º e 15º, Rio de Janeiro - RJ

Produzido por:  
Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.  
CNPJ: 33.109.356/0004-60  
Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

Resp. Técnico: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447  
Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor:  
Tel.: 0800 940 6730 / [sac@granado.com.br](mailto:sac@granado.com.br) / [www.granado.com.br](http://www.granado.com.br)

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**

As expressões “**POLVILHO ANTISSÉPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S. A..

**HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO DE BULA**

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	No. do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
2025	Incluir após protocolo	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	Incluir após protocolo	Incluir após protocolo	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	Incluir após protocolo	Adequação a RDC 769/22, RDC 770/22 e IN 200/22	VP/VPS	100 g - Tradicional, Sport, Fresh e Pink  200 g - Tradicional
11/10/2023	1087008239	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	11/10/2023	1087008239	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	11/10/2023	Dizeres legais: nome e CRF do responsável técnico	VP/VPS	100 g - Tradicional, Sport, Fresh e Pink  200 g - Tradicional
01/10/2021	3875914210	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	01/10/2021	3875914210	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	01/10/2021	Inclusão da frase obrigatória Vigimed	VP/VPS	100 g - Tradicional, Sport, Fresh e Pink  200 g - Tradicional
16/04/2021	1461870212	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de	16/04/2021	1461870212	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de	16/04/2021	Inclusão da frase obrigatória Vigimed	VP/VPS	100 g - Tradicional, Sport, Fresh e Pink

		Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12			Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12				200 g - Tradicional
04/06/2014	Transação 4780412014	10458 – MEDICAMENTO NOVO – Inclusão inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	04/06/2014	Transação 4780412014	10458 – MEDICAMENTO NOVO – Inclusão inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	04/06/2014	Adequação à RDC 60/2012	VP/VPS	100 g – Tradicional, Sport, Fresh e Pink  200 g - Tradicional
N/A  Petição física	N/A  Petição física	N/A  Petição física	16/11/2009	875092091	10270 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – Adequação à RDC 47/09	16/11/2009	Adequação à RDC 47/2009	VP/VPS	100 g – Tradicional, Sport, Fresh e Pink  200 g - Tradicional