



**DECIPRAX<sup>®</sup>**

**(oxalato de escitalopram)**

**Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.**

**Comprimido revestido**

**10mg e 20mg**

## I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:

**Deciprax®**  
**oxalato de escitalopram**

### MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA

#### APRESENTAÇÕES

Comprimido revestido.

Embalagens contendo 7, 15, 30 ou 60 comprimidos revestidos de 10mg.

Embalagens contendo 7, 15 ou 30 comprimidos revestidos de 20mg.

#### VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ORAL

#### USO ADULTO

#### COMPOSIÇÕES

Cada comprimido revestido de 10mg contém:

oxalato de escitalopram (equivalente a 10mg de escitalopram) .....12,78mg

excipientes q.s.p. ....1 comprimido revestido

(celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, talco, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol e dióxido de titânio).

Cada comprimido revestido de 20mg contém:

oxalato de escitalopram (equivalente a 20mg de escitalopram) .....25,55mg

excipientes q.s.p. ....1 comprimido revestido

(celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, talco, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol e dióxido de titânio).

## II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Deciprax<sup>®</sup> é indicado para:

- tratamento e prevenção da recaída ou recorrência da depressão;
- tratamento do Transtorno do Pânico, com ou sem agorafobia;
- tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG);
- tratamento do Transtorno de Ansiedade Social (fobia social);
- tratamento do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC).

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Deciprax<sup>®</sup> é um medicamento da classe dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), que é uma classe do grupo dos antidepressivos. O Deciprax<sup>®</sup> age no cérebro, onde corrige as concentrações inadequadas de determinadas substâncias denominadas neurotransmissores, em especial a serotonina, que causam os sintomas na situação de doença.

Pode demorar cerca de duas semanas até você começar a se sentir melhor. Continue a tomar Deciprax<sup>®</sup>, mesmo que leve algum tempo até você se sentir melhor.

Você deve procurar seu médico se você não se sentir melhor ou se sentir pior.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### Contraindicações do uso de Deciprax<sup>®</sup>

Não tomar Deciprax<sup>®</sup> se você for alérgico a qualquer um dos componentes mencionados anteriormente (veja em: “Composição”).

Não tomar Deciprax<sup>®</sup> se estiver em uso de medicamentos conhecidos como Inibidores da Monoaminoxidase (IMAO), incluindo selegilina (usada no tratamento de Mal de Parkinson), moclobemida (usada no tratamento da depressão) e linezolida (um antibiótico).

Não tomar Deciprax<sup>®</sup> se você nasceu com ou teve um episódio de arritmia cardíaca (observado em eletrocardiograma, exame que avalia como o coração está funcionando).

Não tomar Deciprax<sup>®</sup> se estiver em uso de medicamentos para tratamento de arritmia cardíaca ou que podem afetar o ritmo cardíaco (veja em: “O que devo saber antes de usar este medicamento?”).

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Avisar ao seu médico se teve ou tem algum problema de saúde. Principalmente, fale com seu médico:

- se você tem epilepsia. O tratamento com Deciprax<sup>®</sup> deve ser descontinuado se ocorrerem convulsões pela primeira vez, ou um aumento da frequência das crises convulsivas (veja em: Quais os males que este medicamento pode me causar?);
- se você tem comprometimento do funcionamento dos rins e/ou do fígado. O seu médico pode ter que ajustar a dose;
- se você tem diabetes. O tratamento com Deciprax<sup>®</sup> pode alterar o controle glicêmico. Pode ser necessário um ajuste da dose do hipoglicemiante oral ou da insulina;
- se você tem níveis de sódio diminuídos no sangue;
- se você tem tendência a sangramentos ou manchas roxas, ou se estiver grávida (ver Gravidez, amamentação e fertilidade);
- se você está em terapia eletroconvulsiva;
- se você tem Doença Cardíaca Coronariana;
- se você tem ou teve problemas cardíacos ou sofreu recentemente um ataque cardíaco;
- se você tem baixa frequência cardíaca de repouso e/ou sabe que pode ter baixa de sal devido à diarreia e vômitos severos e prolongados ou uso de diuréticos;
- se você tem ou teve aceleração ou irregularidade nos batimentos cardíacos, desmaios, colapso ou tontura ao levantar-se, que pode indicar funcionamento anormal do batimento cardíaco;
- se você tem ou teve problemas de dilatação das pupilas (midríase).

#### Atenção

Pacientes com Transtorno Bipolar do Humor na fase da depressão, ao fazer uso de antidepressivos podem apresentar uma virada para a fase maníaca. A mania é caracterizada por mudanças incomuns e rápidas das ideias, alegria inapropriada e atividade física excessiva. Se você se sentir assim com Deciprax<sup>®</sup>, contate o seu médico imediatamente.

Sintomas como inquietude ou dificuldade de sentar ou permanecer em pé também podem ocorrer nas primeiras semanas de tratamento. Avise imediatamente o seu médico se você sentir esses sintomas.

### **Pensamentos suicidas e agravamento da sua depressão ou distúrbio de ansiedade.**

Se você está deprimido e/ou tem distúrbios de ansiedade poderá por vezes pensar em autoagressão ou suicídio. Estes pensamentos podem aumentar quando utilizar pela primeira vez um antidepressivo, pois estes medicamentos necessitam de tempo para começarem a agir no organismo, geralmente cerca de duas semanas, às vezes mais. Caso você:

- já tenha tido pensamentos de suicídio ou de causar ferimento a si próprio;
- seja um adulto jovem. Informação proveniente de estudos clínicos revelou um maior risco de comportamento suicida em adultos com idade inferior a 25 anos com problemas psiquiátricos tratados com antidepressivos.

Se você tiver pensamentos de suicídio ou de causar ferimento a si próprio a qualquer momento, contatar o seu médico ou ir a um hospital imediatamente.

Você pode achar útil dizer a um parente ou amigo próximo que você está deprimido ou tem um transtorno de ansiedade, e pedir-lhes para que leiam a bula. Você pode pedir-lhes para dizer-lhe se acham que a sua depressão ou ansiedade está piorando ou se há mudanças no seu comportamento.

### **Principais interações medicamentosas com Deciprax®**

Alguns medicamentos podem afetar a ação de outros, e isso pode causar sérias reações adversas.

Comunicar ao seu médico todos os medicamentos que estiver em uso ou que tenha feito uso nos 14 dias prévios ao início do tratamento com Deciprax® (mesmo os sem necessidade de receita controlada), inclusive outros medicamentos para depressão (veja em: “Quando não devo usar este medicamento?”).

O Deciprax® e os medicamentos abaixo devem ser associados com orientação médica:

- **Inibidores Não Seletivos da Monoaminoxidase (IMAO)** - que contenham fenelzina, iproniazida, isocarboxazida, nialamida e tranilcipromina como ingredientes ativos. Se você fez uso de algum destes medicamentos, após a interrupção você precisará esperar 14 dias antes de começar a tomar o Deciprax®. Após a interrupção do Deciprax®, você deve esperar 7 dias antes de usar qualquer um destes medicamentos;
- **Inibidores Seletivos da MAO-A, reversíveis**, que contenham moclobemida (usada para tratar depressão);
- **Inibidores Irreversíveis da MAO-B**, que contenham selegilina (usada para tratar doença de Parkinson). Eles aumentam o risco de efeitos adversos;
- **o antibiótico linezolida;**
- **lítio** (usado no tratamento do Transtorno Maníaco-Depressivo) e **triptofano;**
- **sumatriptano e similares (usados para tratar enxaqueca) e tramadol e medicamentos similares (usado para tratar dores severas)**. Estes medicamentos aumentam o risco de surgimento de efeitos adversos;
- **cimetidina, lansoprazol e omeprazol** (usados para tratamento de úlceras estomacais), **fluvoxamina** (antidepressivo) e **ticlopidina** (usado para reduzir o risco de derrame). Estes medicamentos podem causar aumento da quantidade do Deciprax®; no organismo.
- **Erva de São João (*Hypericum perforatum*)** – um medicamento fitoterápico usado para tratamento da depressão;
- **ácido acetilsalicílico** (aspirina) e **Anti-Inflamatórios Não Esteroidais** (usados para o alívio da dor ou para afinar o sangue, chamados então de anticoagulantes). Podem aumentar a tendência ao sangramento;
- **varfarina, dipiridamol e fenprocumona** (medicamentos usados para afinar o sangue, chamados então de anticoagulantes). O tempo de coagulação deverá ser avaliado pelo seu médico quando o Deciprax® for introduzido ou descontinuado, para verificar se a sua dose do anticoagulante continua adequada;
- **mefloquina** (usada para tratar malária), **bupropiona** (usada para tratar depressão) e **tramadol** (usado para tratar dor grave) – pela possibilidade da diminuição do limiar para convulsões;
- **neurolépticos** (para tratar esquizofrenia, psicoses) e **antidepressivos** (antidepressivos tricíclicos e ISRSs) – pela possibilidade da diminuição do limiar para convulsões;
- **imipramina e desipramina** (ambos usados para tratamento da depressão);

- **flecainida, propafenona e metoprolol** (usados para doenças cardiovasculares), **clomipramina e nortriptilina** (antidepressivos) e **risperidona, tioridazina e haloperidol** (antipsicóticos). Pode ser necessário o ajuste da dose do Deciprax®;
- **medicamentos que alteram a função plaquetária** - risco um pouco aumentado de sangramentos anormais;
- **medicamentos que diminuem os níveis de potássio ou magnésio no sangue**, pois nestas condições aumenta o risco de alteração fatal do ritmo cardíaco.

**Não use Deciprax®** se você faz uso de outros medicamentos para arritmia cardíaca ou medicamentos que podem afetar o ritmo cardíaco, como antiarrítmicos das Classes IA e III, antipsicóticos (ex.: derivados de fenotiazina, pimozida, haloperidol), antidepressivos tricíclicos, alguns antimicrobianos (ex.: esparfloxacino, moxifloxacino, eritromicina IV, pentamidina ou medicamentos antimaláricos particularmente halofantrina), alguns anti-histamínicos (astemizol, mizolastol). Se você tiver qualquer dúvida procure seu médico. Veja “Quando não devo usar este medicamento?”.

#### **O Deciprax® interage com alimentos ou bebidas?**

O oxalato de escitalopram não interage com alimentos ou bebidas.

#### **O Deciprax® interage com o álcool?**

O Deciprax® não potencializa os efeitos do álcool. Apesar de não haver interação, recomenda-se não ingerir álcool durante o tratamento com o Deciprax®.

#### **Gravidez, amamentação e fertilidade**

Informe o seu médico se você está grávida ou planeja ficar grávida. Não tome Deciprax® se você estiver grávida ou amamentando, exceto se você e seu médico já conversaram sobre os riscos e benefícios relacionados.

Se você fizer uso de Deciprax® nos 3 últimos meses da sua gravidez, você deve estar ciente que as seguintes reações poderão ser notadas no seu recém-nascido: problemas respiratórios, pele azulada, convulsões, mudanças na temperatura corporal, dificuldades de alimentação, vômitos, açúcar baixo no sangue, contrações espontâneas dos músculos, reflexos vívidos, tremores, icterícia, irritabilidade, letargia, choro constante, sonolência e dificuldades para dormir. Se o seu recém-nascido apresenta algum destes sintomas, por favor, contate o seu médico imediatamente.

Se você tomar Deciprax® perto do final da gravidez, poderá existir um risco aumentado de sangramento vaginal intenso logo após o parto, especialmente se você tiver um histórico de distúrbios hemorrágicos. O seu médico ou obstetra deve saber que está tomando Deciprax® para que possam aconselhá-la.

Informe ao seu obstetra e/ou médico que você está utilizando Deciprax®. Quando utilizado durante a gravidez, especialmente nos últimos três meses, medicamentos como Deciprax® podem aumentar o risco de uma doença grave em bebês, chamada de Hipertensão Pulmonar Persistente do Recém-Nascido (HPPN) fazendo o bebê respirar mais rápido e apresentar um tom azulado. Estes sintomas geralmente começam nas primeiras 24 horas após o nascimento do bebê. Se isso acontecer com seu bebê, o obstetra e/ou médico deverá ser consultado imediatamente.

Se usado durante a gravidez, o Deciprax® não deve nunca ser interrompido abruptamente.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Deciprax® pode ser excretado no leite materno.

O citalopram, um medicamento parecido com o Deciprax®, mostrou reduzir a qualidade do esperma em estudos em animais. Teoricamente, isto pode afetar a fertilidade, mas até o momento nenhum impacto sobre a fertilidade em humanos foi observado.

Se você está grávida, amamentando, desconfia que esteja grávida ou planeja engravidar, consulte seu médico ou o farmacêutico antes de usar Deciprax®.

(veja: “Quando não devo usar este medicamento?”).

**Uso contraindicado no aleitamento ou na doação de leite humano.**

**Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois pode ser excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.**

Este medicamento pode aumentar o risco de alteração grave nos batimentos cardíacos, que pode ser potencialmente fatal (morte súbita).

Não tome este medicamento se você tiver uma alteração no coração chamada síndrome congênita de prolongamento do intervalo QT (ou síndrome do QT longo), ou se você já teve algum episódio de ritmo cardíaco anormal, porque pode ser perigoso e provocar alterações do ritmo do coração, inclusive com risco de morte. Avise seu médico se você tiver bradicardia (diminuição da frequência cardíaca), insuficiência cardíaca ou outras doenças do coração, ou se você souber que tem baixo nível de potássio ou de magnésio no sangue. Avise seu médico se você estiver utilizando outros medicamentos, especialmente medicamentos que causam prolongamento do intervalo QT (alteração do ritmo do coração no eletrocardiograma), medicamentos para arritmia (para corrigir o ritmo do coração) ou medicamentos diuréticos (remédios para eliminar água do corpo).

Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas durante todo o tratamento, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.

O uso deste medicamento pode causar tontura, desmaios ou perda da consciência, expondo o paciente a quedas ou acidentes.

**Atenção: Contém o corante dióxido de titânio.**

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

## 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Deciprax® 10mg apresenta-se como comprimido oblongo, semiabaulado e revestido de branco.

Deciprax® 20mg apresenta-se como comprimido oblongo, semiabaulado e revestido de branco.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

### Instruções de uso

O comprimido revestido de Deciprax® é administrado por via oral, uma única vez ao dia. O comprimido revestido de Deciprax® pode ser tomado em qualquer momento do dia, com ou sem alimentos. Preferencialmente tomar sempre no mesmo horário. Engolir o comprimido revestido com água, sem mastigá-lo.

### Posologia

#### Para o tratamento e prevenção da recaída ou recorrência da depressão

A dose recomendada normalmente é de 10mg ao dia. Dependendo da resposta individual, a dose pode ser aumentada pelo seu médico até um máximo de 20mg ao dia. Usualmente 2-4 semanas são necessárias para obter uma resposta antidepressiva. Após remissão dos sintomas, o tratamento por pelo menos 6 meses é requerido para consolidação da resposta.

#### Para o tratamento do Transtorno do Pânico com ou sem agorafobia

A dose inicial para a 1ª semana é de 5mg ao dia (apenas para iniciar o tratamento), aumentada a seguir para 10mg ao dia, a dose terapêutica. Esta dose também pode ser aumentada até um máximo de 20mg ao dia pelo seu médico, se ele achar necessário.

Pacientes suscetíveis a ataques de pânico podem apresentar um aumento da ansiedade logo após o início do tratamento, que geralmente se normaliza nas 2 primeiras semanas de uso do medicamento. Uma dose inicial menor é recomendada para evitar ou amenizar esse efeito. A melhora total é atingida após aproximadamente 3 meses. O tratamento é de longa duração.

#### Para o tratamento do Transtorno de Ansiedade Social (fobia social)

A dose usual terapêutica é de 10mg ao dia. Conforme a resposta individual, a dose pode ser diminuída para 5mg ao dia (para proporcionar melhor tolerabilidade ao tratamento) ou aumentada até um máximo de 20mg ao dia pelo seu médico (dose terapêutica que também pode ser utilizada se necessário).

Geralmente, para o alívio dos sintomas, é necessário um período mínimo de 2 a 4 semanas. Tratamento por no mínimo 3 meses é recomendado para consolidação da resposta. Tratamento por até 6 meses mostrou prevenir novos episódios e deve ser considerado pelo médico, pois a resposta é individual. Por isso, seu médico deve lhe avaliar regularmente.

#### **Para o tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG)**

A dose inicial usual é de 10mg ao dia. Pode ser aumentada até um máximo de 20mg ao dia pelo seu médico. O tratamento por 3 meses é recomendado para consolidação da resposta. Tratamento por no mínimo 6 meses mostrou prevenir novos episódios e deve ser considerado pelo médico, pois a resposta é individual. Por isso, seu médico deve lhe avaliar regularmente.

#### **Para o tratamento do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC)**

A dose inicial usual é de 10mg ao dia. A dose poderá ser aumentada pelo seu médico até um máximo de 20mg ao dia.

Como o TOC é uma doença crônica, você deve ser tratado por um período suficiente até estar livre dos sintomas. Este período pode ser durante vários meses, de acordo com o critério de seu médico. Os benefícios do tratamento e a dose devem ser reavaliados regularmente.

#### **Pacientes idosos (>65 anos)**

Pacientes idosos devem iniciar o tratamento com o Deciprax<sup>®</sup> com metade da dose mínima usualmente recomendada, ou seja, 5mg/dia. A dose poderá ser aumentada pelo seu médico até 10mg por dia.

#### **Crianças e adolescentes (<18 anos)**

O Deciprax<sup>®</sup> não é recomendado para crianças e adolescentes.

#### **Uso em crianças e adolescentes**

O Deciprax<sup>®</sup> normalmente não deve ser usado no tratamento de crianças e adolescentes com menos de 18 anos. Você também deve saber que os pacientes com menos de 18 anos apresentam, um risco maior para alguns efeitos adversos, tais como tentativas de suicídio, pensamentos suicidas e hostilidade (predominantemente agressividade, comportamento opositor e raiva), se fizerem uso desta classe de medicamentos. Apesar disto, seu médico pode prescrever Deciprax<sup>®</sup> para pacientes com menos de 18 anos se achar necessário. Se o seu médico prescreveu Deciprax<sup>®</sup> para um paciente com menos de 18 anos, por favor, volte ao seu médico e converse com ele. Você deve informar ao seu médico se algum dos sintomas mencionados acima surgirem ou piorarem em pacientes com menos de 18 anos.

Os efeitos em longo prazo em relação ao desenvolvimento do crescimento, maturação, aprendizado e comportamento em pacientes desta faixa etária e oxalato de escitalopram ainda não foram demonstrados.

**Este medicamento não é recomendado em crianças.**

#### **Função renal reduzida**

Não é necessário ajuste de dose em pacientes com comprometimento renal leve ou moderado. Deve-se ter cuidado com pacientes com função renal gravemente reduzida (depuração de creatinina <30mL/min).

#### **Função hepática reduzida**

Recomenda-se que os pacientes com problemas no fígado leves ou moderados utilizem uma dose inicial de 5mg ao dia durante as duas primeiras semanas do tratamento. Dependendo da resposta individual, seu médico pode aumentar para 10mg ao dia, a dose terapêutica usual.

#### **Duração do tratamento com Deciprax<sup>®</sup>**

Como ocorre com outros medicamentos para depressão e Transtorno do Pânico, a ação do medicamento demora algumas semanas para ser percebida.

Nunca trocar a dose do medicamento sem antes falar com seu médico.

A duração do tratamento é individual. Usualmente, o período mínimo do tratamento é de 6 meses.

Pacientes que tem depressão recorrente se beneficiam de tratamento continuado, às vezes por vários anos, para a prevenção de novos episódios.

Não interrompa o uso do Deciprax<sup>®</sup> até que o seu médico lhe diga para fazê-lo.

Quando você tiver terminado o seu período de tratamento, é recomendado, geralmente, que a dose do Deciprax<sup>®</sup> seja gradualmente reduzida por algumas semanas.

Quando você interrompe o tratamento com o Deciprax<sup>®</sup>, especialmente se de forma abrupta, você pode sentir sintomas de descontinuação. Eles são comuns quando o tratamento com o Deciprax<sup>®</sup> é interrompido. O risco é maior quando se usa o oxalato de escitalopram por períodos longos, em doses altas ou quando a dose é reduzida muito rápido. A maioria das pessoas acha que estes sintomas são amenos e toleráveis, e permanecem assim por até 2 semanas. Porém, em alguns pacientes eles podem ser de grande intensidade ou prolongados (2-3 meses ou mais). Se você apresentar sintomas de descontinuação graves quando parar de usar o Deciprax<sup>®</sup>, por favor, contate o seu médico. Ele poderá pedir para você retomar o uso do Deciprax<sup>®</sup> e retirá-lo mais lentamente. Esses sintomas não são indicativos de vício.

Os sintomas de descontinuação incluem: sensação de tontura (instabilidade), sensações de agulhas na pele, sensações de queimação e de choques elétricos (menos comuns) – inclusive na cabeça, alterações do sono (sonhos vívidos, pesadelos, dificuldade para dormir), ansiedade, dores de cabeça, náusea, suor aumentado (inclui suores noturnos), inquietude ou agitação, tremores, confusão ou desorientação, inconstância emocional, irritabilidade, diarreia, alterações visuais, palpitações.

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esqueceu de tomar uma dose, e lembrou-se até antes de deitar-se para dormir, pode fazer uso da dose excepcionalmente neste momento. No dia seguinte, retome o horário usual de uso do medicamento. Se você se lembrar somente no meio da noite, ou no dia seguinte, ignore a dose esquecida e retome o tratamento como de costume. Não tomar a dose em dobro.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Como todos os medicamentos, o Deciprax<sup>®</sup> pode causar efeitos adversos, apesar de que, nem todos os pacientes os apresentam.

Os efeitos adversos são geralmente amenos e desaparecem espontaneamente após alguns dias de tratamento. Por favor, esteja atento, pois muitos desses sintomas podem ser da sua doença e desaparecerão quando você melhorar.

**Procure o seu médico se você apresentar algum dos efeitos adversos listados abaixo durante o seu tratamento:**

**Reação muito comum** - ocorre em mais de 10% (>1/10) dos pacientes que utilizam este medicamento:

- náusea;
- dor de cabeça.

**Reação comum** - ocorre entre 1% e 10% (>1/100 e ≤1/10) dos pacientes que utilizam este medicamento:

- nariz entupido ou com coriza (sinusite);
- aumento ou diminuição do apetite;
- ansiedade, inquietude, sonhos anormais, dificuldades para dormir, sonolência diurna, tonturas, bocejos, tremores, sensação de agulhadas na pele;
- diarreia, constipação, vômitos, boca seca;
- aumento do suor;
- dores musculares e nas articulações (mialgias e artralgias);
- distúrbios sexuais (retardo ejaculatório, dificuldades de ereção, diminuição do desejo sexual e, em mulheres, dificuldades para chegar ao orgasmo);
- cansaço, febre;
- aumento do peso.

**Reação incomum** - ocorre entre 0,1% e 1% (>1/1.000 e ≤1/100) dos pacientes que utilizam este medicamento:

- sangramentos inesperados, o que inclui sangramentos gastrointestinais;
- urticária, eczemas (rash), coceira (prurido);
- ranger de dentes, agitação, nervosismo, ataque de pânico, estado confusional;
- alterações no sono, alterações no paladar e desmaio;
- pupilas aumentadas (midríase), distúrbios visuais, barulhos nos ouvidos (tinnitus);
- perda de cabelo;
- sangramento vaginal;
- diminuição de peso;
- aceleração dos batimentos cardíacos;
- inchaços nos braços ou pernas;
- sangramento nasal.

**Reação rara** - ocorre entre 0,01% e 0,1% ( $>1/10.000$  e  $\leq 1/1.000$ ) dos pacientes que utilizam este medicamento:

- se você sentir inchaço na pele, língua, lábios ou face, ou apresentar dificuldades para respirar ou engolir (reação alérgica), contate o seu médico ou vá diretamente para um hospital com serviço de emergência;
- se você apresentar febre alta, agitação, confusão, espasmos e contrações abruptas dos músculos, esses podem ser sinais de uma condição rara denominada síndrome serotoninérgica. Se você se sentir assim, contate o seu médico imediatamente;
- agressividade, despersonalização, alucinação;
- diminuição dos batimentos do coração.

**Desconhecida (frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis):**

- pensamentos suicidas e de autoflagelação, veja também: (“O que devo saber antes de usar este medicamento?”).
- níveis diminuídos de sódio no sangue (os sintomas são náuseas, mal-estar, fraqueza muscular e confusão);
- tontura ao levantar-se por queda da pressão (hipotensão ortostática);
- alterações nos exames de função hepática (aumento das enzimas hepáticas no sangue);
- transtornos do movimento (movimentos involuntários dos músculos);
- ereção dolorosa (priapismo);
- alterações de coagulação, que incluem sangramentos da pele e mucosas (equimoses) e diminuição do número de plaquetas no sangue (trombocitopenia);
- sangramento vaginal intenso logo após o nascimento (hemorragia pós-parto), ver Gravidez, amamentação e fertilidade para obter mais informações;
- edema agudo da pele ou mucosas (angioedemas);
- aumento da quantidade de urina excretada (secreção inadequada do hormônio antidiurético);
- aumento dos níveis sanguíneos do hormônio prolactina;
- presença de leite em mulheres que não estão amamentando;
- mania;
- um aumento do risco de fraturas ósseas foi observado em pacientes que utilizam este tipo de medicamento;
- alteração do ritmo cardíaco (chamada “Prolongamento do intervalo QT”, observada em exame de eletrocardiograma, exame que avalia a atividade elétrica do coração).

Outros efeitos adversos ocorrem com todos os medicamentos que agem de forma semelhante ao escitalopram (o ingrediente ativo Deciprax<sup>®</sup>). São eles:

- inquietude (acatisia);
- anorexia.

Se você apresentar algum dos efeitos adversos abaixo listados, você deve contatar imediatamente o seu médico ou ir diretamente para um hospital com serviço de emergência:

- dificuldade para urinar;
- convulsões (veja em: “O que devo saber antes de usar este medicamento?”);
- cor amarelada da pele ou no branco dos olhos. Podem ser sinais de problemas no fígado/hepatite.

- batimentos cardíacos acelerados ou irregulares, desmaios que podem ser sintomas de uma condição que causa risco à vida conhecida como Torsade de Pointes.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Contatar o médico imediatamente ou ir ao hospital mais próximo, mesmo na ausência de desconforto ou sinais de intoxicação, para que sejam realizados os procedimentos médicos adequados. Não existe antídoto específico. O tratamento é sintomático e de suporte. Levar a caixa do Deciprax® ao médico ou hospital.

Sintomas de superdose incluem tonturas, tremores, agitação, vômitos, convulsões, coma, náuseas, mudança no ritmo cardíaco, diminuição da pressão arterial e alteração do equilíbrio líquido/sal do corpo.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**III – DIZERES LEGAIS:**

Registro: 1.7817.0804

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO COM RETENÇÃO DE RECEITA.**



**Registrado por: Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.**

Rua Bonnard (Green Valley I) n° 980 - Bloco 12, Nível 3, Sala A - Alphaville Empresarial  
- Barueri - SP CEP 06465-134 - C.N.P.J.: 61.082.426/0002-07 - Indústria Brasileira

**Produzido por: Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.**

Anápolis – GO



### Anexo B – Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
05/11/2015	0967983/15-9	10457 – SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	05/11/2015	0967983/15-9	10457 – SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	05/11/2015	VERSÃO INICIAL	VP/VPS	Comprimido revestido
10/11/2015	0977029/15-1	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/11/2015	0977029/15-1	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	10/11/2015	I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO	VP/VPS	Comprimido revestido
30/08/2016	2235009/16-8	10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação a intercambialidade	30/08/2016	2235009/16-8	10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação a intercambialidade	30/08/2016	I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO: Adição da frase sobre intercambialidade, segundo a RDC nº 58/2014	VP/VPS	Comprimido revestido
13/03/2018	0194360/18-0	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	13/03/2018	0194360/18-0	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	13/03/2018	I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO (Inclusão de nova apresentação)  III – DIZERES LEGAIS	VP/VPS	Comprimido revestido
18/09/2018	0908288/18-3	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	18/09/2018	0908288/18-3	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	18/09/2018	I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO (Inclusão de nova apresentação)  4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Comprimido revestido
							I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO (Inclusão de nova apresentação)  5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES	VPS	

							8. POSOLOGIA E MODO DE USAR		
07/07/2021	2642392/21-0	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	07/07/2021	2642392/21-0	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	07/07/2021	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Comprimido revestido
							4. CONTRAINDICAÇÕES 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	
01/02/2022	0404674/22-4	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	01/02/2022	0404674/22-4	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	01/02/2022	CORREÇÃO ORTOGRÁFICA	VP	Comprimido revestido
							5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR	VPS	
13/07/2023	0723876/23-1	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	13/07/2023	0723876/23-1	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	13/07/2023	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Comprimido revestido
							5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	
25/07/2023	0771719/23-0	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	25/07/2023	0771719/23-0	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	25/07/2023	8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Comprimido revestido
							9. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	
--		10450 – SIMILAR – Notificação de	--		10450 – SIMILAR – Notificação de	--	Atualização do texto de bula em conformidade com o novo marco de rotulagem, incluindo adequações	VP/VPS	Comprimido revestido

		Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12			Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12		conforme a RDC nº 768/2022 e a inserção de frases de alerta em atendimento à RDC nº 770/2022 e à Instrução Normativa nº 200/2022.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--