

# ZINPASS<sup>®</sup> EZE

**(rosuvastatina cálcica, ezetimiba)**

Sanofi Medley Farmacêutica Ltda.

Comprimido Revestido

10,0 + 10,0 mg | 20,0 + 10,0 mg | 40,0 + 10,0 mg

## ZINPASS® EZE

rosuvastatina cálcica + ezetimiba

### APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos de 10 mg + 10 mg: embalagem com 30 comprimidos.

Comprimidos revestidos de 20 mg + 10 mg: embalagem com 30 comprimidos.

Comprimidos revestidos de 40 mg + 10 mg: embalagem com 30 comprimidos.

### USO ORAL. USO ADULTO.

### COMPOSIÇÃO

**ZINPASS® EZE 10 mg + 10 mg:** cada comprimido revestido contém 10,40 mg de rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina base e 10 mg de ezetimiba.

**ZINPASS® EZE 20 mg + 10 mg:** cada comprimido revestido contém 20,80 mg de rosuvastatina cálcica equivalente a 20 mg de rosuvastatina base e 10 mg de ezetimiba.

**ZINPASS® EZE 40 mg + 10 mg:** cada comprimido revestido contém 41,60 mg de rosuvastatina cálcica equivalente a 40 mg de rosuvastatina base e 10 mg de ezetimiba.

Excipientes: lactose monoidratada, celulose microcristalina, laurilsulfato de sódio, povidona, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, dióxido de titânio, talco, óxido de ferro amarelo<sup>(1)</sup>, óxido de ferro vermelho<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> exclusivo do comprimido de 20 mg + 10 mg

<sup>(2)</sup> exclusivo do comprimido de 40 mg + 10 mg

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

ZINPASS EZE é indicado como terapia adjuvante à dieta, em pacientes considerados como de alto ou muito alto risco cardiovascular, quando a resposta à dieta e aos exercícios é inadequada em pacientes adultos com aumento de colesterol (hipercolesterolemia primária - familiar heterozigótica ou não-familiar) ou com alteração dos níveis lipídicos (dislipidemia mista).

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

ZINPASS EZE é uma associação de duas substâncias que atuam de maneira conjunta para auxiliar na redução do colesterol. Uma das substâncias atua inibindo uma importante enzima para a fabricação do colesterol pelo organismo, chamada HMG-CoA redutase. A outra substância atua reduzindo a absorção do colesterol no intestino delgado. Esta medicação deve ser utilizada juntamente com alterações no estilo de vida, que incluem dieta redutora de colesterol, aumento da atividade física e controle do peso.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ZINPASS EZE não deve ser utilizado por pacientes:

- hipersensíveis (alérgicos) a ezetimiba, rosuvastatina ou a qualquer outro componente dos comprimidos de ZINPASS EZE;
- com doenças ativas do fígado e insuficiência hepática (alteração no funcionamento do fígado);

- que estão grávidas ou amamentando, ou que pretendem engravidar e que não estão usando métodos contraceptivos apropriados;
- com alterações severas do funcionamento dos rins (insuficiência renal);
- com histórico de dores musculares recorrentes ou sem explicação (miopatias);
- que estão em tratamento com ciclosporina;
- que recebem a combinação medicamentosa de sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (utilizado para a infecção viral do fígado chamada hepatite C);
- que recebem darolutamida (usada para tratar o câncer);
- que estão em tratamento com belumosudil;

A formulação contendo 40 mg / 10 mg (a dose mais alta) é contraindicada em pacientes com fatores que aumentem o risco de doenças musculares graves. Esses fatores são:

- alterações moderadas do funcionamento dos rins;
- hipotireoidismo (alteração que diminui a função da tireoide);
- história pessoal e familiar de doenças musculares hereditárias;
- história prévia de dores musculares recorrentes ou sem explicação (miopatias) devido à outras medicações que inibam a enzima HMG-CoA redutase (estatinas, por exemplo) ou fibratos;
- consumo regular de grandes quantidades de álcool;
- situações em que possa haver aumento dos níveis deste medicamento no sangue;
- pacientes asiáticos;
- pacientes em uso de fibratos para reduzir o colesterol.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos.**

**Categoria de risco na gravidez: X.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.**

**Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Não tome ZINPASS EZE:**

- se você for alérgico à ezetimiba, rosuvastatina ou a qualquer outro componente deste medicamento (Veja “COMPOSIÇÃO”);
- se você tiver atualmente problemas no fígado;
- se estiver grávida ou amamentando. Se engravidar enquanto estiver tomando ZINPASS EZE pare de tomar imediatamente e informe o seu médico. As mulheres devem evitar engravidar enquanto tomam ZINPASS EZE usando medidas contraceptivas adequadas;

- se você tiver problemas renais graves;
- se você tiver dores musculares repetidas ou sem explicação (miopatia);
- se você toma um medicamento chamado ciclosporina (usado, por exemplo, após transplantes de órgãos);
- se você toma um medicamento chamado belumosil (usado, por exemplo, para tratar a doença crônica do enxerto contra o hospedeiro);
- se algum dos itens acima se aplica a você (ou está em dúvida), volte e consulte o seu médico;
- se você estiver tomando uma combinação de medicamentos de sofosbuvir/ velpatasvir/ voxilaprevir (usado para infecção viral do fígado chamada hepatite C);
- se você estiver tomando darolutamida (usado para tratar o câncer);
- terapia de longo prazo com estatina pode, em casos excepcionais, desenvolver doença pulmonar intersticial, apresentando sensação de falta de ar, tosse, fadiga, perda de peso e febre. Se você apresentar os sintomas consulte o seu médico;
- não é indicado durante a gravidez e a lactação. As mulheres em idade fértil devem usar medidas de contracepção apropriadas.

Além disso, não tome ZINPASS EZE 40 mg / 10 mg (a dose mais alta):

- se você tiver problemas renais moderados (em caso de dúvida, pergunte ao seu médico);
- se sua glândula tireoide não estiver funcionando corretamente (hipotireoidismo);
- se você tiver dores musculares repetidas ou sem explicação, um histórico pessoal ou familiar de problemas musculares, ou um histórico anterior de problemas musculares ao tomar outros medicamentos que reduzem o colesterol;
- se você bebe regularmente grandes quantidades de álcool;
- se você for de origem asiática (japonês, chinês, filipino, vietnamita, coreano e indiano);
- se você toma outros medicamentos chamados fibratos para diminuir o colesterol (veja a seção “Outros medicamentos e ZINPASS EZE”).

Se algum dos itens acima se aplica a você (ou está em dúvida), volte e consulte o seu médico.

#### **4.1. Advertências e precauções**

Informe o seu médico sobre todas as suas condições médicas, incluindo alergias.

Converse com seu médico ou farmacêutico antes de tomar ZINPASS EZE:

- se você tiver problemas com seus rins;
- se você bebe grandes quantidades de álcool ou já teve doença hepática, ZINPASS EZE pode não ser ideal para você;
- se você teve dores musculares repetidas ou sem explicação, um histórico pessoal ou familiar de problemas musculares, ou um histórico prévio de problemas musculares ao tomar outros medicamentos que reduzem o colesterol. Informe imediatamente o seu médico se tiver dores musculares sem explicação, especialmente se sentir indisposição ou febre. Informe também o seu médico ou farmacêutico se apresentar fraqueza muscular constante;
- se sua glândula tireoide não estiver funcionando corretamente;

- se você apresenta uma insuficiência respiratória grave;
- se você toma medicamentos usados para combater a infecção pelo HIV, p. ex., ritonavir com lopinavir e/ou atazanavir, consulte "Outros medicamentos e ZINPASS EZE";
- se você toma outros medicamentos chamados fibratos para diminuir o colesterol (consulte "Outros medicamentos e ZINPASS EZE");
- se você estiver prestes a realizar uma operação. Você pode precisar parar de tomar ZINPASS EZE por um curto período de tempo;
- se você for de origem asiática - ou seja, japonês, chinês, filipino, vietnamita, coreano e indiano. Seu médico precisa escolher a dose de início correta de ZINPASS EZE que se adeque a você;
- se você estiver tomando ou tomou nos últimos 7 dias um medicamento chamado ácido fusídico (um remédio para infecção bacteriana) por via oral ou por injeção. A combinação de ácido fusídico e ZINPASS EZE pode levar a graves problemas musculares (rabdomiólise).

Enquanto estiver usando este medicamento, o seu médico irá monitorá-lo rigorosamente se tiver diabetes ou estiver em risco de desenvolver diabetes. É provável que esteja em risco de desenvolver diabetes se tiver níveis elevados de açúcares e gorduras no sangue, excesso de peso e pressão arterial elevada.

Em um pequeno número de pessoas, as estatinas podem afetar o fígado. Isto é identificado por um teste simples que busca níveis aumentados de enzimas hepáticas no sangue. Por este motivo, o seu médico irá regularizar este exame de sangue (teste de função hepática) durante o tratamento com ZINPASS EZE. É importante ir ao médico para os exames laboratoriais prescritos.

**Este medicamento pode causar danos ao fígado. Por isso, seu uso requer acompanhamento médico estrito e exames laboratoriais periódicos para controle.**

Problemas graves de pele, como reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS) e síndrome de Stevens-Johnson foram relatados durante o tratamento com ZINPASS EZE. Os sintomas de DRESS podem incluir sintomas semelhantes aos da gripe, bem como erupção cutânea com febre e linfonodos aumentados e aumento dos números de um tipo específico de glóbulos brancos no sangue chamado eosinófilo (eosinofilia). Outros resultados alterados de exames de sangue podem incluir (mas não estão limitados a) níveis aumentados de enzimas hepáticas. Os sintomas da Síndrome de Stevens-Johnson podem incluir bolhas, descamação ou sangramento na pele (incluindo lábios, olhos, boca, nariz, órgãos genitais, mãos ou pés), com ou sem erupção cutânea. Você também pode apresentar sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, calafrios ou dores musculares. Se você desenvolver reações cutâneas graves ou qualquer uma das reações listadas acima, pare o tratamento imediatamente e procure o seu médico.

Se você tem ou teve miastenia (doença que causa fraqueza geral dos músculos incluindo alguns casos nos músculos usados para respirar), ou miastenia ocular (doença que causa fraqueza muscular no olho) uma vez que as estatinas podem ocasionalmente agravar as condições ou levar à ocorrência de miastenia.

#### **4.2. Outros medicamentos e ZINPASS EZE**

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver tomando, tomou recentemente ou venha a tomar quaisquer outros medicamentos. Em particular, informe o seu médico se estiver tomando qualquer um dos seguintes:

- ciclosporina (um medicamento usado frequentemente em pacientes transplantados de órgãos). **Não tome ZINPASS EZE enquanto estiver tomando ciclosporina;**
- medicamentos para prevenir coágulos sanguíneos, tais como varfarina, fenprocumon, acenocoumarol ou fluindiona (anticoagulantes);
- colestiramina (um medicamento para baixar o colesterol), porque afeta a maneira como o medicamento funciona;
- fibratos, tais como genfibrozila, fenofibrato (medicamentos para baixar o colesterol). **Não tome os comprimidos de ZINPASS EZE 40 mg / 10 mg com o uso concomitante de um fibrato.**

- remédios para indigestão contendo alumínio e magnésio (usado para neutralizar o ácido em seu estômago);
- eritromicina (um antibiótico);
- um contraceptivo oral (a pílula) ou terapia de reposição hormonal;
- ácido fusídico - se você precisar tomar ácido fusídico via oral para tratar uma infecção bacteriana, você precisará interromper temporariamente o uso deste medicamento, pois o uso concomitante com ácido fusídico pode raramente levar à fraqueza, sensibilidade ou dor muscular (rabdomiólise);
- Anticoagulantes, incluindo varfarina, acenocumarol ou fluindiona (o seu efeito anticoagulante e o risco de hemorragia podem aumentar enquanto tomados em conjunto com ZINPASS EZE), ticagrelor ou clopidogrel;
- Regorafenibe (usado no tratamento de câncer);
- Darolutamida (usado no tratamento de câncer);
- capmatinibe (usado no tratamento de câncer);
- fosfatamatinib (usado no tratamento de contagem de plaquetas baixo);
- febuxostate (usado para tratar e prevenir níveis sanguíneos altos de ácido úrico)
- teriflunomida (usado no tratamento de esclerose múltipla)
- Medicamentos usados para combater infecções virais incluindo infecção por HIV ou hepatite C, isoladamente ou em combinação com: ritonavir, lopinavir, atazanavir, ledipasvir, sofosbuvir, voxilaprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glecaprevir e pibrentasvir (consulte a seção "Advertências e precauções");
- roxadustat (medicamento que aumenta o número de células vermelhas sanguíneas e nível de hemoglobina em pacientes com doença renal crônica);
- enasidenib (usado no tratamento de leucemia mieloide aguda)
- tafamidis (usado no tratamento de Amiloidose por Transtirretina)

Você também deve informar qualquer médico que prescreva um novo medicamento para você que você está tomando ZINPASS EZE.

#### **4.3. Dados não clínicos**

- Não foram realizados estudos para avaliar a combinação de ezetimiba e rosuvastatina,
- Reações observadas no estudo de toxicidade de doses repetidas incluíram alterações no fígado, vesícula biliar, testículos, rins, opacidade ocular, cérebro e tecidos músculo-esqueléticos;
- A ezetimiba e a rosuvastatina atravessam barreira placentária em ratas e coelhas prenhas;
- Em coelhas grávidas, que receberam rosuvastatina em dose equivalente à dose de 40mg/dia em humanos a partir do dia 6 até o dia 18 de gestação, observou-se redução na viabilidade fetal e aumento da mortalidade materna. Também foram observados perda de peso materna, hipoatividade, mortalidade e alterações em órgãos como fígado, vesícula biliar, rins, bexiga, estômago, além de músculos como os intercostais e cardíacos. Toxicidades semelhantes foram observadas em um estudo investigativo realizado em coelhos machos com a dose equivalente à dose humana máxima de 40 mg/dia.

#### **4.4. ZINPASS EZE com álcool**

Não tome ZINPASS EZE 40 mg/10 mg comprimidos (a dose mais alta), se você beber regularmente grandes quantidades de álcool.

#### 4.5. Gravidez e amamentação

Se estiver grávida ou amamentando, pensar que está grávida ou estiver planejando ter um bebê, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Não tome ZINPASS EZE se estiver grávida, estiver tentando engravidar ou achar que está grávida. Se engravidar enquanto toma ZINPASS EZE, pare de tomar imediatamente e informe o seu médico.

Não tome ZINPASS EZE se estiver amamentando, porque não se sabe se o medicamento é transmitido para o leite materno.

**Uso contraindicado no aleitamento ou na doação de leite humano. Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois pode ser excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.**

#### 4.6. Crianças e adolescentes

ZINPASS EZE não é adequado para uso em crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade.

#### 4.7. Dirigir e usar máquinas

Não se espera que ZINPASS EZE interfira com sua capacidade de dirigir ou usar máquinas. No entanto, deve ser levado em consideração que algumas pessoas podem ficar tontas depois de tomar ZINPASS EZE.

#### 4.8. Pacientes idosos

ZINPASS EZE deve ser prescrito com cautela nos idosos. Não é necessário, entretanto, ajuste de dose para pacientes idosos.

#### 4.9. Pacientes com insuficiência renal

A dose de 40 mg/10 mg é contraindicada em pacientes com insuficiência renal moderada. O uso de ZINPASS EZE em pacientes com insuficiência renal grave é contraindicado para todas as doses.

**Atenção: ZINPASS EZE 10 mg + 10 mg contém lactose (tipo de açúcar) abaixo de 0,25g por comprimido.**

**Atenção: ZINPASS EZE 20 mg + 10 mg contém 269 mg de lactose (tipo de açúcar) por comprimido.**

**Atenção: ZINPASS EZE 40 mg + 10 mg contém 385 mg de lactose (tipo de açúcar) por comprimido.**

Se o seu médico lhe disser que você possui intolerância a alguns tipos de açúcares, entre em contato com o seu médico antes de tomar este medicamento.

**Atenção: ZINPASS EZE contém os corantes dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo (ZINPASS EZE 20 mg + 10 mg) e óxido de ferro vermelho (ZINPASS EZE 40 mg + 10 mg).**

Pare de tomar ZINPASS EZE e fale com seu médico imediatamente:

- Se tiver ruptura muscular (que pode ser indicada por dor aguda localizada anormal nos músculos).

- Se tem síndrome “lúpus-like”, que pode incluir erupção cutânea, doenças articulares, efeitos nas células sanguíneas (febre, fadiga, infecção, mal-estar).

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

A doação de sangue é contraindicada durante o tratamento de hiperlipidemia familiar com rosuvastatina (um dos princípios ativos de Zinpass Eze), devido ao dano que ele pode causar à pessoa que receber o sangue.

## 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

ZINPASS EZE deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### Características do medicamento

ZINPASS EZE 10 mg / 10 mg: comprimido revestido branco a esbranquiçado, oblongo.

ZINPASS EZE 20 mg / 10 mg: comprimido revestido amarelo a levemente amarelado, oblongo.

ZINPASS EZE 40 mg / 10 mg: comprimido revestido rosa, oblongo.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sempre tome este medicamento exatamente da forma como o seu médico ou farmacêutico lhe disse. Verifique com o seu médico ou farmacêutico se não tiver certeza.

- Antes de começar ZINPASS EZE, você deve estar em uma dieta para reduzir seu colesterol.
- Você deve manter essa dieta enquanto toma ZINPASS EZE.

Seu médico determinará a potência do comprimido apropriada para você, dependendo do seu tratamento atual e do seu estado de risco pessoal.

A dose é um comprimido de ZINPASS EZE por via oral uma vez ao dia.

A dose máxima diária de rosuvastatina é de 40 mg. É destinado apenas para pacientes com níveis elevados de colesterol e um alto risco de ataques cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais cujos níveis de colesterol não são baixos o suficiente com 20 mg.

Tente tomar seu comprimido no mesmo horário todos os dias para ajudá-lo a lembrar disso. Você pode tomar o comprimido com ou sem alimentos.

Se o seu médico tiver prescrito ZINPASS EZE juntamente com colestiramina ou qualquer outro sequestrante de ácido biliar (medicamentos para baixar o colesterol), você deve tomar ZINPASS EZE pelo menos 2 horas antes ou 4 horas após tomar o sequestrante de ácido biliar.

### 6.1. Verificações regulares de colesterol

É importante retornar ao seu médico para verificar regularmente o colesterol para se certificar de que seu colesterol atingiu e está permanecendo no nível correto. O seu médico pode decidir aumentar a sua dose de modo que esteja tomando a quantidade de medicamento que seja adequada para você.

### **Se você parar de tomar ZINPASS EZE**

Seu colesterol pode subir de novo.

Se você tiver alguma outra dúvida sobre o uso deste medicamento, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esqueceu de tomar uma dose, não tome uma dose duplicada para compensar uma dose esquecida. Nunca se deve tomar uma dose duplicada para compensar a dose esquecida.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, no entanto, nem todas as pessoas os apresentam.

Entre em contato com seu médico imediatamente se você apresentar dor, sensibilidade ou fraqueza muscular sem explicação. Isso ocorre porque em ocasiões raras, os problemas musculares, incluindo a quebra muscular resultando em danos renais, podem ser graves e podem se tornar uma condição potencialmente fatal.

### **8.1. ZINPASS EZE – associação de rosuvastatina cálcica e ezetimiba**

**Reações comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):** dor muscular, aumento de enzimas hepáticas, distensão abdominal, dor abdominal e constipação.

**Reações incomuns (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento):** alterações urinárias, aumento de enzimas hepáticas, doença muscular, fadiga, espasmo muscular e tontura.

As reações adversas do medicamento anteriormente reportadas para um dos componentes individuais (rosuvastatina cálcica ou ezetimiba) podem ser potenciais efeitos indesejados de ZINPASS EZE. Miastenia gravis (doença que causa fraqueza muscular geral incluindo alguns casos nos músculos usados para respirar). Miastenia ocular (doença que causa fraqueza muscular no olho). Fale com seu profissional de saúde se você experimentar fraqueza nos braços ou pernas que apresenta piora após períodos de atividade, visão duplicada ou caimento das pálpebras dos olhos, dificuldade de engolir, ou respiração encurtada.

### **8.2. Rosuvastatina cálcica (isolada)**

**Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):** cefaleia, cansaço, vertigem, náusea, faringite e outros eventos respiratórios tais como rinites e sinusites e diabetes mellitus.

**Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento):** coceira, lesões de pele e urticária.

**Reações raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento):** reações de hipersensibilidade (incluindo angioedema), rabdomiólise, síndrome “lúpus-like”, ruptura muscular, pancreatite, doença muscular, queda no número das plaquetas.

**Reações muito raras (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento):** dor articular, icterícia, hepatite, alterações nos nervos (polineuropatia), sangramento na urina, perda de memória, crescimento das mamas (ginecomastia).

**Reações com frequência desconhecida:** alterações nos nervos periféricos (neuropatia periférica), depressão, distúrbios do sono (incluindo insônia e pesadelos), tosse, falta de ar, diarreia, síndrome de Stevens Johnson, sintomas semelhantes aos da gripe e erupção cutânea com febre e aumento dos gânglios linfáticos (estes podem ser sintomas de DRESS – Síndrome da farmacodermia com eosinofilia e sintomas sistêmicos), distúrbios dos tendões às vezes complicados por ruptura, inchaço, miopatia autoimune associada à estatina (miopatia necrosante imunomediada - forma muito rara de dano muscular causado pelo sistema imunológico em pessoas que tomam medicamentos com estatina).

### 8.3. Ezetimiba (isolada)

**Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):** dor de cabeça, diarreia e flatulência.

**Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento):** aumento das enzimas do fígado (ALT e/ou AST), aumento de enzima muscular (CPK) no sangue, aumento da enzima do fígado chamada gama-glutamyltransferase, teste de função hepática anormal, tosse, azia, refluxo gastroesofágico, náusea, dor articular, espasmos musculares, dor no pescoço, diminuição do apetite, onda de calor, hipertensão, dor do peito, dor, formigamentos, boca seca, gastrite, coceira, lesões de pele, dor nas costas, fraqueza muscular, dor em extremidades, inchaço, cansaço.

**Reações com frequência desconhecida:** redução das plaquetas, pancreatite, lesões de pele (eritema multiforme), hipersensibilidade e alergia, hepatite, pedra na vesícula, inflamação da vesícula, depressão, falta de ar, problema muscular grave, destruição do tecido muscular esquelético, fraqueza dos músculos oculares. Se você apresentar náuseas ou vômitos, febre, sensação de cansaço, perda de apetite, dor na parte superior do abdômen, urina de cor escura, fezes de cor clara, amarelamento da pele e/ou da parte branca dos olhos, coceira e/ou erupção cutânea. Estes podem ser sinais de lesão hepática induzida por medicamentos.

#### Relato de efeitos colaterais

Se você apresentar efeitos colaterais, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não mencionados nesta bula. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente através do sistema nacional de notificação listado no Apêndice V. Ao informar os efeitos colaterais, você pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

**Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista.**

## 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Em caso de tomar uma dose superior à recomendada, entre imediatamente em contato com seu médico ou farmacêutico.

Não há um tratamento específico para a superdosagem.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.

#### DIZERES LEGAIS

#### VENDA SOB PRESCRIÇÃO

Registro: 1.8326.0461

Importado e Registrado por:

**Sanofi Medley Farmacêutica Ltda.**

Rua Conde Domingos Papaiz, 413 - Suzano – SP

CNPJ 10.588.595/0010-92

Produzido por:

**Sanofi İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**

Büyükkaristiran/Lüleburgaz-Kirklareli - Turquia



 *Atendimento ao consumidor*  
**sac.brasil@sanofi.com**  
0800-703-0014

**IB280526**

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 22/06/2026.

## Anexo B

## Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de Bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
-	Gerado no momento do peticionamento	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	-	Gerado no momento do peticionamento	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	-	<b>VP:</b> 4.O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?  <b>VPS:</b> 6.INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 9.REAÇÕES ADVERSAS	VP/VPS	(10,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (20,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (40,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30
27/01/2026	0084572/26-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	17/04/2024	0484318/24-1	11315 - Alteração de texto de bula por avaliação de dados clínicos - GESEF	31/12/2025	<b>VP:</b> 4.O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? <b>VPS:</b> 2.RESULTADOS DE EFICÁCIA 3.CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 5.ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6.INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 9.REAÇÕES ADVERSAS	VP/VPS	(10,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (20,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (40,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de Bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
18/11/2025	1510526/25-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	18/11/2025	1510526/25-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	18/11/2025	VP: 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? VPS: 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 9. REAÇÕES ADVERSAS	VP/VPS	(10,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (20,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (40,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30
30/04/2024	1341509/24-9	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	30/04/2024	1341509/24-9	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	30/04/2024	VP: 3. Quando não devo usar este medicamento? 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? VPS: 4. Contraindicações 6. Interações medicamentosas	VP/VPS	(10,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (20,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (40,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30
01/08/2023	0802187/23-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no	01/08/2023	0802187/23-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no	01/08/2023	VP: 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? VPS: 4. Contraindicações 6. Interações Medicamentosas	VP/VPS	(10,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (20,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (40,0 + 10,0) MG COM REV CT BL

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de Bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
		Bulário RDC 60/12			Bulário RDC 60/12				AL AL X 30
12/05/2023	0483540/23-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	12/05/2023	0483540/23-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	12/05/2023	VP: 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?  VPS: 5. Advertências e Precauções 6. Interações Medicamentosas 9. Reações Adversas	VP/VPS	(10,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (20,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (40,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30
03/08/2021	3028797/21-6	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	03/08/2021	3028797/21-6	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	03/08/2021	VPS 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR	VPS	(10,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (20,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (40,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30
15/07/2021	2753076/21-9	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de	15/07/2021	2753076/21-9	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto	15/07/2021	VP 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE	VP/VPS	(10,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (20,0 + 10,0) MG COM REV CT BL

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de Bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
		Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12			de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12		MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? VPS 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS		AL AL X 30 (40,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30
11/03/2021	0956090/21-4	10451 – MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	11/03/2021	0956090/21-4	10451 – MEDICAMENTO NOVO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	11/03/2021	VP 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? VPS 9. REAÇÕES ADVERSAS	VP/VPS	(10,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (20,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (40,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30
10/11/2020	3948419/20-0	10458 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	22/12/2017	2316887/17-1	1460 MEDICAMENTO NOVO - REGISTRO DE NOVA ASSOCIAÇÃO NO PAÍS	02/07/2020	Primeira emissão	VP/VPS	(10,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (20,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30 (40,0 + 10,0) MG COM REV CT BL AL AL X 30